



## Patienteninformation und Patiententagebuch zur Anwendung des Rivastigmin-neuraxpharm® transdermalen Pflasters

Liebe Patienten, liebe Angehörige,

- ✘ Ihr Arzt hat Ihnen **Rivastigmin-neuraxpharm® transdermale Pflaster** verordnet.
- ✘ Die Anwendung ist in der der Packung beiliegenden Gebrauchsinformation detailliert beschrieben, diese sollten Sie in jedem Falle beachten!
- ✘ Diese Kurzanleitung soll Sie zusätzlich bei der Anwendung des Pflasters unterstützen.

Dieses Patiententagebuch zur Anwendung von Rivastigmin-neuraxpharm® Pflaster wurde als Teil der Zulassungsaufgaben erstellt. Im Rahmen des Risikomanagement-Plans wurden, über die Routinemaßnahmen hinaus, zusätzliche risikominimierende Maßnahmen mit der Zulassung des Arzneimittels beauftragt, um das Risiko des Auftretens von Überdosierungen aufgrund inkorrektener Anwendung von Rivastigmin-neuraxpharm® Pflaster zu reduzieren und das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Rivastigmin-neuraxpharm® Pflaster zu erhöhen.

Dieses Patiententagebuch ist damit verpflichtender Teil der Zulassung, um sicherzustellen, dass Angehörige der Heilberufe, die Rivastigmin-neuraxpharm® Pflaster verschreiben und zur Anwendung bringen, sowie Patienten die besonderen Sicherheitsanforderungen kennen und berücksichtigen.





## Wichtige Hinweise für die Pflaster-Anwendung

- ⊗ Tragen Sie immer nur **ein Rivastigmin-neuraxpharm® Pflaster** zur gleichen Zeit. Entfernen Sie vorsichtig das vorhandene Pflaster, bevor Sie ein Neues anwenden. Zerschneiden Sie das Pflaster nicht.
- ⊗ Das Pflaster wird **1x täglich** zu etwa der gleichen Uhrzeit an anderer Körperstelle erneuert.
- ⊗ Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster von **1 bis 4** oder **5 bis 8** verwenden, jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle wie zuvor.

**Kleben Sie täglich ein Pflaster auf einen der in den Abbildungen dargestellten Anwendungsbereichen.**





Sie können innerhalb der gleichen Anwendungsbereiche (vorne und hinten) das neue Pflaster aufkleben, aber nicht exakt an derselben Stelle wie zuvor.

VORNE



ODER

HINTEN






## Richtige Anwendung des Rivastigmin-neuraxpharm® transdermalen Pflasters




Entfernen Sie sorgfältig das vorhandene Pflaster, bevor Sie ein Neues verwenden. Patienten, die mit der Behandlung zum ersten Mal beginnen oder die Behandlung nach einer Behandlungsunterbrechung wieder aufnehmen, bitte bei der zweiten Abbildung beginnen.



Jedes Pflaster ist einzeln in einem versiegelten Schutzbeutel verpackt. Öffnen Sie den Beutel erst, wenn Sie gleich danach das Pflaster aufkleben wollen. Schneiden Sie den Beutel an der gestrichelten Linie mit einer Schere auf und entnehmen Sie dem Beutel das Pflaster.



Die selbstklebende Seite des Pflasters ist mit einer Schutzfolie überzogen. Ziehen Sie eine Hälfte der Schutzfolie ab und achten Sie darauf, die Klebeflächen nicht mit den Fingern zu berühren.



Legen Sie das Pflaster mit der selbstklebenden Seite auf den oberen oder unteren Rückenbereich, den Oberarm oder den Brustkorb und ziehen Sie dann die zweite Hälfte der Schutzfolie ab.



Drücken Sie dann das Pflaster mit der Handfläche mindestens 30 Sekunden fest, sodass alle Kanten ordentlich haften.

Bitte bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.  
In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.  
Sie können das Arzneimittel bei Zimmertemperatur (15–25°C) lagern.

**Wichtig: Sollten Sie weitere Fragen haben oder Nebenwirkungen bei sich beobachten, kontaktieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker!**

**Mit freundlicher Empfehlung der neuraxpharm Arzneimittel GmbH**

neuraxpharm Arzneimittel GmbH, Elisabeth-Selbert-Str. 23, 40764 Langenfeld  
Tel. (0 21 73) 10 60 - 0, E-Mail: [info@neuraxpharm.de](mailto:info@neuraxpharm.de)